



# OxiGold LA 20%

REG. SAGARPA: C-9668-002

OXITETRACICLINA DIHIDRATADA

Antibiótico  
de amplio  
espectro



**CARONTE**  
P H A R M A



[www.carontepharma.com](http://www.carontepharma.com)

# OxiGold LA 20%

REG. SAGARPA: C-9668-002

Oxitetraciclina Dihidratada

## Antibiótico de amplio espectro

**DESCRIPCIÓN:** Antibiótico de amplio espectro y larga acción formulado a base de Oxitetraciclina Dihidratada en solución acuosa, con efecto bacteriostático. Indicado en el tratamiento de enfermedades comunes de los animales originadas por gérmenes gram (+) y gram (-). Los componentes de su fórmula le confieren una excelente biodisponibilidad y absorción controlada y prolongada en el sitio de inyección del antibiótico.

Es altamente soluble en agua y no produce irritación, por lo que se puede utilizar en infusiones intrauterinas.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** OxiGold LA 20%, actúa inhibiendo la síntesis proteica al unirse a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, no permitiendo la unión de la (tRNA).

**INDICACIONES:** Está indicado en el tratamiento y control de las enfermedades causadas por gérmenes susceptibles a la acción de este antibiótico como bacterias gram (+) y gram (-), mycoplasmas, rickettsias y protozoarios.

**Bovinos:** Tratamiento de anaplasmosis, neumonías, leptospirosis, gabarro, mastitis sistémica, pierna negra, actinobacilosis, artritis infecciosa, ojo rosado y heridas infectadas.

**Porcinos:** Neumonía enzoótica, afecciones respiratorias, leptospirosis, erisipela, mastitis sistémica, artritis infecciosa e infecciones por heridas expuestas. En la prevención y control de la pasteurellosis neumónica y síndrome MMA.

**Ovinos y Caprinos:** Tratamiento de la neumonía infecciosa, aborto enzoótico, pierna negra, gabarro, mastitis sistémica, artritis infecciosa y heridas infectadas.

**USOS EN:** Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

**DOSIS ÚNICA:** 1 ml por cada 10 kgs de peso vivo. Bovinos, porcinos, ovinos y caprinos.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular profunda.


**ADVERTENCIAS:** No aplicar este producto el mismo día en que se aplica hierro en lechones. No administre este producto 14 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No destinar la leche de los animales tratados a consumo sino hasta después de 60 horas de la última aplicación. Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

**PRESENTACIÓN:** Frasco de 100 ml, 250 ml y 500 ml.

### Formulación:

#### Cada 1 ml contiene:

Oxitetraciclina	200 mg
Vehículo, c.b.p.	1 ml



**CARONTE**  
P H A R M A

HECHO EN MÉXICO PARA:

**Vetnova Suppliers de México, S.A. de C.V.**

Calle Piedras Negras No. 332, Interior A, P.I.L.

Gómez Palacio, Durango. México C.P. 35077

Teléfono: 52 (871) 159 0795



[www.carontepharma.com](http://www.carontepharma.com)